

中国山榄科植物志资料

庄璇

(中国科学院昆明植物研究所)

MATERIAE AD FLORAM SAPOTACEARUM SINENSIIUM

Chuang Hsuan

(Institutum Botanicum Kunmingense Academiae Sinicae)

滇山榄, 新组合

Sinosideroxylon yunnanense (C.Y. Wu) H. Chuang, comb. nov.

Planchonella yunnanensis C.Y. Wu, 云南热带亚热带植物区系研究报告1:26, pl. 24, t. 1, 1965; 云南植物志1:311, 图版73, 图3-5, 1977.

Aubreville (1903) 以种子形态特征为分属标准之一。本种浆果卵圆形, 种子长圆状卵圆形, 具圆形、近基生的疤痕, 因此将本种归入铁榄属

铁榄 新组合

Sinosideroxylon pedunculatum (Hemsl.) H. Chuang, comb. nov.

Sarcosperma? pepunculata Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 26: 68. 1889; Chun et How, 植物分类学报 7 (1): 74. 1958. — *Planchonella pedunculatum* (Hemsl.) Lam et Kerpel in Blume 3: 258, f. 8, 1939; van Royen ibid. 1: 359, 1957; 吴征镒等, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 26, 1965; 云南植物志 1: 311, 图版 73, 图 6, 1977. — *Pouteria pedunculata* Baehni in Candollea 9: 486. 1942.

根据种子形态特征, 将此种归入本属内是适宜的

毛叶铁榄 新变种

Sinosideroxylon pedunculatum (Hemsl.) H. Chuang var. *pubifolium* H. Chuang, var. nov.

A var. *pedunculato* ramulis juvenilibus foliisque utroque dense ferrugineo-sericeis, demum supra foliis glabrescentibus, subtus fulvescento-sericeis differt.

Typus: Y. K. Li 296 (IBG)

Guangxi: Longzhou, Y. K. Li 296.

本变种与原变种 *S. pedunculatum* var. *pedunculatum* 的区别是: 嫩叶两面及小枝先端密被锈色绢毛, 后来叶上面变无毛, 下面绢毛变为褐色。

广西: 龙州, 板闭、炮台山, 1965年5月4日, 李荫昆 296 (模式标本)。