

DOI: 10.11931/guihaia.gxzw202205034

苏桂军, 李霞, 陈芋西, 等, 2023. 花生铝响应类受体蛋白激酶 AhPRK4 的原核表达分析 [J]. 广西植物, 43(6): 1070–1079.

SU GJ, LI X, CHEN YX, et al., 2023. Prokaryotic expression analysis of aluminum associated receptor-like protein kinase AhPRK4 in peanut (*Arachis hypogaea*) [J]. *Guihaia*, 43(6): 1070–1079.



花生铝响应类受体蛋白激酶 AhPRK4 的原核表达分析

苏桂军¹, 李霞¹, 陈芋西¹, 詹洁^{1,2,3}, 王爱勤^{1,2,3}, 何龙飞^{1,2,3}, 肖冬^{1,2,3*}

(1. 广西大学 农学院/植物科学国家级实验教学示范中心, 南宁 530004; 2. 广西农业环境与农产品安全重点实验室, 南宁 530004; 3. 广西高校作物栽培学与耕作学重点实验室, 南宁 530004)

摘要: 花粉类受体蛋白激酶(pollen receptor-like protein kinase, PRK) 是一类富含 LRR 结构域的一类受体蛋白激酶, 不仅在花粉发育和植物受精中发挥作用, 也在胁迫响应中发挥作用。基于对前期花生根尖铝胁迫转录组数据的分析, 我们发现了在转录水平响应铝胁迫的花粉类受体蛋白激酶基因 *AhPRK4*, 为探究 *AhPRK4* 在花生铝胁迫中的功能, 该文进一步分析了铝胁迫处理下 *AhPRK4* 在花生耐铝品种‘99-1507’和铝敏感品种‘中花 2 号’(‘ZH2’)根尖中的转录变化, 通过序列分析、进化树构建等分析了 *AhPRK4* 蛋白的结构特点和亲缘关系, 克隆了 *AhPRK4* 的胞内域序列 (*AhPRK4*-CD), 并通过原核表达和体外磷酸化体系分析了 *AhPRK4*-CD 的自磷酸化活性。结果表明: (1) 不同铝处理时间及不同铝浓度处理后, *AhPRK4* 的转录水平上调, 显著响应铝处理, 是铝诱导基因; (2) *AhPRK4* 含有 673 个氨基酸, 属于 LRR-III 蛋白激酶家族成员, 具跨膜域和信号肽, 且预测具有磷酸化活性位点; (3) 体外诱导表达出约 71 kD 的可溶性蛋白 (*GST*-*AhPRK4*-CD), 经凝胶亲和层析纯化, 得到基于蛋白印迹实验 (Western Blot) 验证正确的重组蛋白, 重组蛋白可发生磷酸化修饰, 但无明显的自磷酸化现象。综上所述, *AhPRK4* 是一个铝胁迫应答基因, 参与花生铝胁迫早期应答机制, 且能发生磷酸化修饰。

关键词: 花生, 铝胁迫, 花粉类受体蛋白激酶, 表达分析, 原核表达

中图分类号: Q943 文献标识码: A 文章编号: 1000-3142(2023)06-1070-10

Prokaryotic expression analysis of aluminum associated receptor-like protein kinase AhPRK4 in peanut (*Arachis hypogaea*)

SU Guijun¹, LI Xia¹, CHEN Yuxi¹, ZHAN Jie^{1,2,3}, WANG Aiqin^{1,2,3},
HE Longfei^{1,2,3}, XIAO Dong^{1,2,3*}

收稿日期: 2022-08-16

基金项目: 国家自然科学基金(31701356)。

第一作者: 苏桂军(1999-), 硕士研究生, 研究方向为作物生理, (E-mail) su_guijun@163.com。

*通信作者: 肖冬, 博士, 副教授, 研究方向为作物生理与分子生物学, (E-mail) xiaodong@gxu.edu.cn。

(1. National Demonstration Center for Experimental Plant Science Education/College of Agriculture, Guangxi University, Nanning 530004, China; 2. Guangxi Key Laboratory for Agro-Environment and Agro-Product Safety, Nanning 530004, China; 3. Key Laboratory of Crop Cultivation and Tillage, Guangxi Colleges and Universities, Nanning 530004, China)

Abstract: The pollen receptor-like protein kinase (PRK) family, an LRR receptor-like protein kinase, not only plays a role in pollen development and fertilization, but also plays a role in stress response. Based on the analysis of transcriptome data that generated in our previous study, we found that *AhPRK4* was an aluminum-responsive gene. To explore the role of *AhPRK4* in response to aluminum stress, we analyzed the expression of *AhPRK4* by qRT-PCR in ‘ZH2’ (Al-sensitive) and ‘99-1507’ (Al-tolerant), clarified the protein structure and genetic relationship of *AhPRK4* by sequence analysis, phylogenetic tree construction and other genetic analysis, constructed the recombinant plasmid by homologous recombination, obtained the intracellular domain recombinant protein of *AhPRK4* by prokaryotic expression technology and determined the activity of the recombinant protein by incubation with phosphorylated antibodies. The results were as follows: (1) The transcription level of *AhPRK4* was up-regulated after different aluminum treatments time and different aluminum concentrations, indicating that *AhPRK4* was an aluminum inducible gene. (2) The *AhPRK4* protein had 673 amino acids with transmembrane domain, signal peptide and phosphorylation active sites, belonging to the LRR-III protein kinase family. (3) The GST-*AhPRK4*-CD recombinant protein was induced *in vitro* and verified by Western Blot. And the recombinant protein had phosphorylated on both serine/threonine and tyrosine residues, but had no significant auto-phosphorylation activity. In conclusion, *AhPRK4* is an aluminum responsive gene, which participates in the regulation of short-term aluminum stress and is phosphorylated *in vitro*.

Key words: peanut (*Arachis hypogaea*), aluminum stress, pollen receptor-like protein kinase, expression analysis, prokaryotic expression

花生 (*Arachis hypogaea*) 是我国重要的油料和经济作物, 是主要的食用植物油来源。在我国, 花生产区可分为南方产区和北方产区。但是南方地区的土壤多为酸性土壤, pH 值在 4.5~6.0 之间, Al_2O_3 含量高, 交换性 Al^{3+} 占阳离子交换量的 20%~80% (李庆逵, 1983)。当 pH 低于 5.0 时, 铝以有毒的形态存在来引起作物毒害, 故酸雨和铝毒被认为是南方地区农作物生长重要的限制因子之一 (李学垣等, 1995)。在我国, 南方产区花生产量低于全国平均水平, 与北方产区相比仍然存在较大的差距 (鲁清等, 2017), 故通过阐明花生受铝毒害的机制, 进而选育耐铝性品种来提高南方花生生产力愈发重要。研究表明花生受铝毒害的部位主要是根尖, 表现为根系生长受抑制、线粒体功能受损、ROS 迸发以及发生细胞程序性死亡等 (詹洁等, 2008; 徐芬芬等, 2014; Huang et al., 2014)。花生响应铝毒害的机制主要包括外部排斥和内部耐受两种, 这两种机制中需要众多成员参与来传递信号, 发挥功能, 最终使得花生响应铝毒害。

类受体蛋白激酶 (receptor-like protein kinases, RLKs) 是一种由胞外域接收信号, 后通过激酶域传

递和激活下游信号通路完成胞内外信号转导的酶活性受体 (马媛媛等, 2005), 在植物中广泛存在, 并可分为多个家族 (Shiu & Bleeker, 2001a, b), 参与众多生长代谢过程的调控, 如参与植物的生长发育进程 (Nibau & Cheung, 2011)、植物对病虫害防御应答 (Yang & Ramonell, 2012) 和植物抵抗非生物胁迫 (Osakabe et al., 2010) 等。PRKs 蛋白是一类富含亮氨酸重复序列 (LRR) 的 RLK 蛋白 (Duckney et al., 2017), 首个 PRK 激酶是在矮牵牛中被发现, 命名为 PRK1, 特异性分布在花粉中, 并在减数分裂中发挥作用 (Mu et al., 1994)。拟南芥中的 6 个 PRK 成员也在花粉中高表达, 并命名为 *AtPRK1-6* (Chang et al., 2013)。研究发现, PRKs 在花粉管发育 (Chang et al., 2013; Duckney et al., 2017)、信号转导 (Huang et al., 2014) 和细胞死亡 (Wrzaczek et al., 2014) 等方面发挥了重要的调控作用, 但关于 PRKs 在胁迫中的功能研究很少, 仅在拟南芥的低水势胁迫下研究发现, 相较于野生型, 突变体 *prk1* 会积累更多的脯氨酸来响应胁迫 (Verslues et al., 2014), 而 PRKs 在铝胁迫下是否有响应还未见报道。

RLKs 通过磷酸化作用传递信号进而响应胁迫。在冷胁迫下,激酶 OST1 (OPEN STOMATA 1) 活性被激活,通过磷酸化 ICE1 (Inducer of CBF expression 1) 来增加该转录因子的蛋白稳定性和转录活性,进而增强拟南芥对低温的抵抗能力 (Ding et al., 2015)。CIPK26 (CBL-interacting protein kinase 26) 与 RBOHF (respiratory burst oxidase homolog F) 的 N 端存在相互作用,并且可磷酸化 RBOHF 来刺激 ROS 产生,进而影响 RBOHF 在植物胁迫应答中的调控 (Drerup et al., 2013)。SOBIR1 (suppressor of BIR1-1) 激酶依赖于其蛋白浓度发生自磷酸化,其第 529 位的苏氨酸以及 $\beta 3$ - αC 环结构对磷酸化至关重要,并影响 SOBIR1 对烟草细胞死亡的调控 (Wei et al., 2022)。拟南芥 CPK28 (calcium-dependent protein kinase 28) 可响应拟南芥 Ca^{2+} 信号路径参与免疫反应和生长发育调控,研究发现 CPK28 具自磷酸化活性,并随着 Ca^{2+} 浓度增加而活性增强,其中第 318 位丝氨酸是关键活性位点,尽管该位点突变不会影响 CPK28 调控营养生长和生殖生长时期的转换,却会对 AtPep1 引发的氧化应激表现高敏性状,同时对丁香假单胞菌具有更强的抵抗力 (Bredow et al., 2021)。这表明 RLKs 的磷酸化活性与这些蛋白在植物胁迫应答中的作用密切相关。

通过对实验室已有转录组数据的挖掘 (Xiao et al., 2021), 我们发现花粉类受体蛋白激酶基因 *AhPRK4* 转录受铝胁迫处理的诱导,并且在不同花生铝耐性品种中有着不同的响应模式,暗示其参与花生铝胁迫响应过程。本研究以 *AhPRK4* 的铝胁迫响应模式和蛋白活性为研究内容,采用 qRT-PCR 检测了不同铝浓度和处理时间条件下, *AhPRK4* 在花生耐铝品种 ‘99-1507’ 和铝敏感品种 ‘中花 2 号’ (‘ZH2’) 的转录变化,对 *AhPRK4* 胞内域进行克隆,并开展了原核表达分析,通过磷酸化抗体对其自磷酸化活性进行检测,拟探讨以下问题:(1) *AhPRK4* 的铝响应模式;(2) *AhPRK4* 胞内域的磷酸化状态。为后续在蛋白质水平上探究 *AhPRK4* 蛋白的生化功能以及在铝胁迫下的作用机制奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料

供试花生品种由中国农业科学院油料作物研

究所提供,并经实验室早期筛选鉴定出的铝敏感品种 ‘中花 2 号’ (‘ZH2’) 和耐铝品种 ‘99-1507’ (詹洁等, 2008)。将花生种子经湿润珍珠岩催芽 3 d 后,去除花生种皮并掐除约 1 cm 的主根根尖,在 26 °C 条件下将材料置于改良的 Hoagland 营养液中培养至第三片真叶长出,转移花生幼苗至 $100 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CaCl_2 溶液 (pH 4.2) 中培养 24 h,之后做以下两种处理:一是用 $100 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ AlCl_3 溶液 (含 $100 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CaCl_2 , pH 4.2) 分别处理花生幼苗 4、8、12、24 h;二是用不同浓度的 AlCl_3 溶液 (50、100、200、400 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 分别处理花生幼苗 4 h 和 8 h。以上两种处理均以改良的 Hoagland 营养液处理作为对照,取约 1 cm 的根尖作为实验材料。

1.2 RNA 提取

先参照植物总 RNA 提取试剂盒 (Promega) 方法提取 RNA,之后参照反转录试剂盒 (Takara) 方法进行 RNA 反转录,获得 cDNA。

1.3 *AhPRK4* 在铝胁迫下表达量检测


根据 *AhPRK4* 基因 CDS (coding sequence) 序列设计荧光定量 PCR 检测引物 (表 1), 参照 TB Green Premix Ex Tap II 酶 (Takara) 说明,设置 qRT-PCR 反应体系和程序,以 *UBQ10R* 为内参,采用 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 法进行基因相对表达量的分析。

表 1 引物序列
Table 1 Primer sequence

引物名称 Primer name	引物序列 (5'-3') Primer sequence (5'-3')	用途 Purpose
<i>AhPRK4</i> -F1	GATGCATTTCGTCGGCATGAG	荧光定量
<i>AhPRK4</i> -R1	GCTAGGAATATGCCCGCTGA	qRT-PCR
<i>UBQ10R</i> -F	CGCACACTCGCTGACTACAAC	
<i>UBQ10R</i> -R	CACGGAGACGGAGGACAAGG	原核表达 (下划线
<i>AhPRK4</i> -F2	<u>GAATTCGTTTCAAGTGATGAGG</u> CCAAGAT	表示酶切位点)
<i>AhPRK4</i> -R2	<u>CTCGAGAAGAGTTT</u> CCGAATAAAAGGACAAG	Prokaryotic expression (underline indicates enzyme digestion site)

1.4 生物信息学分析

利用在线网站 ProtParam tool 预测 *AhPRK4* 的分子量、等电点等理化性质 (<https://web.expasy.org/protparam/>); 通过 WoLF PSORT 来预测其亚细胞定位 (<https://wolfsort.hgc.jp/>); 通过 NCBI 比对获得其他物种对应的基因序列,利用 MEGA 7.0 构建进化树,并在软件 DNAMAN 进行多序列比对,同时通过



A. 100 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 不同铝处理时间; B. 不同浓度铝处理 4 h; C. 不同浓度铝处理 8 h。不同小写字母代表 0.05 水平上存在差异。
A. 100 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ aluminum for different time of treatments; B. Different concentrations of aluminum treatment for 4 h; C. Different concentrations of aluminum treatment for 8 h. Different lowercase letters indicate significant differences at the 0.05 level.

图 1 *AhPRK4* 在铝处理下的表达分析

Fig. 1 Expression analysis of *AhPRK4* under aluminum treatment

光调控元件,干旱胁迫响应元件和 60 K 蛋白结合位点(图 4:A)。以拟南芥数据库为筛选基础,筛选 *AhPRK4* 的相互作用蛋白,发现 *AhPRK4* 可与多个蛋白存在互作,包括 LMK1 (leucine-rich repeat receptor-like kinase with extracellular malectin-like domain 1)、ABC16 (ATP-binding cassette B16)、PME30 (pectin methylesterase 30)、激酶 AT1G34420 (leucine-rich repeat transmembrane protein kinase family protein)、HAK1 (HDS-associated RLK1)、PEPR2 (PEP1 receptor 2)、AT1G12460 (leucine-rich repeat protein kinase family protein)、AT1G24650 (leucine-rich repeat protein kinase family protein)、FE11、AT1G49100 (leucine-rich repeat protein kinase family protein)(图 4:B),推测 *AhPRK4* 可能参与激素调控、细胞死亡、非生物胁迫应答、生物防御、细胞壁膨大等调控过程。

2.3 *AhPRK4* 激酶域克隆和原核表达载体构建

以 'ZH2' 根尖 cDNA 为模板,克隆到 *AhPRK4* 胞内域片段 (*AhPRK4*-CD)(图 5:A),序列长度为 1 122 bp,与目的片段 (LOC107470884) 序列 100% 同源。连接 *AhPRK4*-CD 片段和 pGEX-6p-1 载体,获得重组质粒 (*AhPRK4*-CD-pGEX-6p-1)(图 5:B)。

2.4 重组蛋白诱导表达和纯化

将含有 *AhPRK4*-CD-pGEX-6p-1 重组质粒的

Rosetta 菌株在 16 $^{\circ}\text{C}$ 、0.5 $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ IPTG 环境中培养,在约 71 kD 处发现诱导后的上清液中有加深的特异性条带,表明其以可溶性的形式存在于上清液中(图 6)。GST-*AhPRK4*-CD 重组蛋白用 Glutathione Sepharose 4B 填料纯化,在结合后用 PBS 洗脱无明显条带(图 7:A),表明层析柱与 GST-*AhPRK4*-CD 重组蛋白结合较好,后经 Elution buffer 洗脱后获得了条带单一且位置正确的目的条带,表明 GST-*AhPRK4*-CD 重组蛋白已成功纯化。将获得的 GST-*AhPRK4*-CD 纯化蛋白根据携带的标签蛋白经特异性 GST 一抗孵育,进行 Western Blot 验证,可以发现在约 71 kD 处出现清晰的特异性目的条带(图 7:B),表明 GST-*AhPRK4*-CD 重组蛋白纯化效果较好。

2.5 重组蛋白体外磷酸化检测

将纯化的 GST-*AhPRK4*-CD 蛋白进行体外磷酸化实验,用磷酸化抗体检测磷酸化水平,用 GST 抗体标定上样水平。由图 8 可知,两个磷酸化抗体孵育后,均能在目标蛋白位置处检测到条带,磷酸化苏氨酸抗体 (anti-pT) 有着更强的磷酸化信号,磷酸化酪氨酸抗体 (anti-pY) 信号较弱,表明该蛋白在原核诱导的过程中已经发生了磷酸化修饰。但与对照组相比,ATP 处理并未使得条带有加深的现象(图 8),暗示 *AhPRK4*-CD 蛋白不存在体外自磷酸化活性。



红线表示跨膜域；紫框表示 LRR 结构域；红三角表示 ATP 结合位点/活性位点；五角星表示活性位点；黑线表示激酶域。
Ah. 花生；**At.** 拟南芥；**Ap.** 非洲相思子；**Mt.** 蒺藜苜蓿；**Vu.** 豇豆；**Gm.** 大豆；**Ca.** 小果咖啡；**Cs.** 茶。蛋白序列号依次为 XP_029145249.1、AT3G20190.1、AT5G35390.1、AT5G20690.1、XP_027356884.1、XP_039687740.1、XP_027905246.1、XP_003523723.2、XP_027124100.1、XP_028090548.1。下同。

Red underline indicates transmembrane domain; purple frame indicates LRR structure domain; red triangles indicate ATP binding site or active site; pentagram indicate active site; black underline indicates kinase domain. **Ah.** *Arachis hypogae*; **At.** *Arabidopsis thaliana*; **Ap.** *Abrus precatorius*; **Mt.** *Medicago truncatula*; **Vu.** *Vigna unguiculata*; **Gm.** *Glycine max*; **Ca.** *Coffea arabica*; **Cs.** *Camellia sinensis*. The accession number of protein sequence are as follows: XP_029145249.1, AT3G20190.1, AT5G35390.1, AT5G20690.1, XP_027356884.1, XP_039687740.1, XP_027905246.1, XP_003523723.2, XP_027124100.1, and XP_028090548.1. The same below.

图 2 花生与其他物种 PRK 氨基酸序列比对

Fig. 2 Comparison of PRK amino acid sequences between peanut and other species




图 3 AhPRK4 进化树分析

Fig. 3 Evolutionary tree analysis of AhPRK4

3 讨论与结论

目前对 PRK 家族在胁迫应答机理的研究还未见系统的报道, 仅在拟南芥突变体 *prk1* 缺水处理下发现, 相较野生型来说, 该突变体会积累 3.2 倍的脯氨酸来响应低水量胁迫 (Verslues et al., 2014)。前人研究也表明随着铝处理浓度的增加和铝处理时间的延长, 花生根系游离脯氨酸的含量整体呈递增的趋势 (徐芬芬等, 2014)。本研究在对铝处理下花生根尖 *AhPRK4* 转录水平的检测





图 4 AhPRK4 启动子元件分析及互作蛋白分析

Fig. 4 Promoter element analysis and interaction protein analysis of AhPRK4




A: M. Marker; 1. 扩增产物。B: M. Marker; 1, 2, 3. 质粒样品编号。

A: M. Marker; 1. Amplified products. B: M. Marker; 1, 2, 3. Plasmid sample number.

图 5 PCR 扩增 AhPRK4-CD 片段及重组质粒电泳检测

Fig. 5 PCR amplification of AhPRK4-CD fragment and detection of recombinant plasmid electrophoresis




M. 蛋白 marker; 1. 未诱导的总蛋白; 2. IPTG 诱导后的总蛋白; 3. IPTG 诱导后裂解液上清; 4. IPTG 诱导后裂解液沉淀。

M. Protein marker; 1. Total uninduced protein; 2. IPTG-induced total protein; 3. IPTG-induced supernatant; 4. IPTG-induced precipitation.

图 6 AhPRK4-CD 原核表达蛋白的 SDS-PAGE 电泳分析

Fig. 6 SDS-PAGE electrophoresis analysis of prokaryotic expression of AhPRK4-CD



M. 蛋白 marker. A: 1. 经 IPTG 诱导后的总蛋白; 2. IPTG 诱导后裂解液上清; 3. 流穿液; 4, 5. PBS 洗脱液; 6, 7. 纯化蛋白样品. B: 1, 2. GST-AhPRK4-CD 纯化蛋白; 3, 4. GST 标签蛋白。

M. Protein marker. A: 1. IPTG-induced total protein; 2. IPTG-induced supernatant; 3. Flowthrough buffer; 4, 5. PBS wash buffer; 6, 7. Purified protein. B: 1, 2. GST-AhPRK4-CD purified protein; 3, 4. GST purified protein.

图 7 GST-AhPRK4-CD 重组蛋白的纯化和 Western Blot 检测

Fig. 7 Purification and Western Blot detection of GST-AhPRK4-CD recombinant protein


在水势胁迫下通过脯氨酸响应胁迫 (Verslues et al., 2014), 故 AhPRK4 也可能参与花粉管发育和响应胁迫中。以 AhPRK4 的拟南芥同源蛋白 AtPRK4 的序列在拟南芥数据库中筛选预测 AhPRK4 的互作蛋白, 发现互作蛋白中以各类型激酶最多, 同时预测 AhPRK4 具有磷酸化位点, 故 AhPRK4 可能以磷酸化与各类型激酶之间形成调控网络。在预测的互作蛋白中, 部分蛋白功能已有报道, 其中 LMK1 调控叶片死亡 (Li et al., 2020), HAK1 可与 PBL27 蛋白互作参与 HDS (herbivore-derived danger) 防御反应 (Uemura et al., 2020), PEPR2 参与 BSCTV (beet severe curly top virus) 病害防御 (Zeng et al., 2020), 推测 AhPRK4 在胁迫防御中起作用, 进一步验证其互

中也发现 AhPRK4 是一个铝胁迫响应基因, 进一步分析 AhPRK4 的表达水平发现其在两个铝耐性不同的花生品种中的表达模式不同, 在不同铝浓度处理下, AhPRK4 表达水平均显著提高, 在铝处理 8 h 后, 在耐铝品种 '99-1507' 中的表达上调更强烈, 暗示 AhPRK4 是花生耐铝相关基因, 在铝胁迫下, AhPRK4 是否与 AtPRK1 功能类似而与应激脯氨酸之间有关联? 有待进一步研究。

AhPRK4 蛋白与其他物种的 PRK 成员的激酶域具有较高的同源性, 表明此结构域在不同物种 PRK 以及同一物种不同 PRK 成员的保守性。系统进化树中, AhPRK4 与 AtPRK4 以及 AtPRK1 在同一分支上, 具有较近的亲缘关系, 其中 AtPRK4 与 AtNET2A 互作共同参与微管运动来调控花粉管发育 (Duckney et al., 2017), AtPRK1 可

作蛋白对探究 AhPRK4 在铝胁迫中的响应机制具有重要意义。除此之外, 本研究对 AhPRK4 基因的启动子元件进行预测, 发现该基因启动子区域含有生长素和 ABA 响应元件。生长素在植物铝胁迫响应信号传递途径中发挥作用, 铝胁迫下植物的生长素在根尖的细胞分布和在细胞的运输可能会受到影响, 进而导致根长受到抑制 (吴道铭等, 2014); 除生长素外, 在大豆铝胁迫与 ABA 实验中也发现, 大豆根尖内源 ABA 与铝处理时间和铝处理浓度呈正相关关系, 并且 ABA 处理可减少铝胁迫下的氧化伤害 (侯宁宁, 2009)。故 ABA 和生长素是否也调控花生铝胁迫? 有待进一步研究。

AhPRK4 属于 LRR-III 类受体蛋白激酶家族



M. 蛋白 marker; -/+ . 是否添加 ATP; **anti-pY**. 酪氨酸磷酸化抗体; **anti-pT**. 苏氨酸磷酸化抗体; **anti-GST**. GST 标签抗体。蛋白 marker 处蓝色条带表示 70 kD 蛋白位置。
M. Protein marker; -/+ . Whether ATP is added; **anti-pY**. Phospho-tyrosine antibody; **anti-pT**. Phospho-threonine antibody; **anti-GST**. GST-Tag mouse monoclonal antibody. The blue band of the marker indicates the location of 70 kD protein.

图 8 GST-AhPRK4-CD 重组蛋白自磷酸化检测

Fig. 8 Auto-phosphorylation detection of GST-AhPRK4-CD recombinant protein

的成员之一,具丝氨酸/苏氨酸激酶域,并经预测具有磷酸化位点,为了验证 AhPRK4 是否可发生磷酸化及探究 AhPRK4 的活性,本研究采用原核表达和亲和柱层析的方法获得 AhPRK4-CD 重组蛋白来探究其生物功能,在蛋白诱导过程中,16 °C 条件下可获得较好的诱导效果。本研究已成功诱导并纯化得到 GST-AhPRK4-CD 重组蛋白,体外磷酸化抗体孵育检测 AhPRK4-CD 重组蛋白可以发生磷酸化修饰,但在酪氨酸位点的磷酸化修饰水平极低,由于我们使用的磷酸化苏氨酸抗体(Cell Signaling Technology, 9381)对磷酸化丝氨酸残基也有一定的识别能力,所以我们认为 AhPRK4-CD 的磷酸化修饰主要发生在丝/苏氨酸残基上。在本研究中,我们未检测到 AhPRK4-CD 的自磷酸化活性,一方面,可能是 AhPRK4 蛋白的自磷酸化活性较低,需要采用更灵敏的检测手段,如同位素标记等方法来进行检测;另一方面,AhPRK4 也可能是一种需要被其他因子磷酸化来共同发挥作用的辅助蛋白,仍需要进一步实验探究。

综上所述,AhPRK4 为铝胁迫应答基因,该基因启动子区域含有胁迫激素应答元件,预测的互作蛋白也可在胁迫下起作用。在此基础上,采用

原核表达的技术成功诱导得到 AhPRK4-CD 纯化蛋白,并验证其可以发生磷酸化修饰,为探究该蛋白在花生铝胁迫中的调控功能奠定了基础。

参考文献:

- BREDOU M, BENDER KW, JOHNSON DA, et al., 2021. phosphorylation-dependent subfunctionalization of the calcium-dependent protein kinase CPK28 [J]. Proc Natl Acad Sci USA, 118(19): e2024272118.
- CHANG F, GU Y, MA H, et al., 2013. AtPRK2 promotes ROP1 activation via RopGEFs in the control of polarized pollen tube growth [J]. Mol Plant, 6(4): 1187-1201.
- DING YL, LI H, ZHANG XY, et al., 2015. OST1 kinase modulates freezing tolerance by enhancing ICE1 stability in *Arabidopsis* [J]. Dev Cell, 32(3): 278-289.
- DRERUP MM, SCHLÜCKING K, HASHIMOTO K, et al., 2013. The calcineurin B-like calcium sensors CBL1 and CBL9 together with their interacting protein kinase CIPK26 regulate the *Arabidopsis* NADPH oxidase RBOHF [J]. Mol Plant, 6(2): 559-569.
- DUCKNEY P, DEEKS MJ, DIXON MR, et al., 2017. Actin-membrane interactions mediated by NETWORKED2 in *Arabidopsis* pollen tubes through associations with pollen receptor-Like kinase 4 and 5 [J]. New Phytol, 216(4): 1170-1180.
- HOU NN, 2009. Study of the regulating mechanism of abscisic acid and antioxidative system on aluminum tolerance in soybean (*Glycine max* L.) [D]. Changchun: Jilin University. [侯宁宁, 2009. 脱落酸和抗氧化系统对大豆耐铝性的调控机制 [D]. 长春: 吉林大学.]
- HUANG WJ, LIU HK, MCCORMICK S, et al., 2014. Tomatopistil factor STIG1 promotes *in vivo* pollen tube growth by binding to phosphatidylinositol 3-phosphate and the extracellular domain of the pollen receptor kinase LePRK2 [J]. Plant Cell, 26(6): 2505-2523.
- HUANG WJ, OO TL, HE HY, et al., 2014. Aluminum induces rapidly mitochondria-dependent programmed cell death in Al-sensitive peanut root tips [J]. Bot Stud, 55(1): 67.
- LI QK, 1983. Red soil of China [M]. Beijing: Science Press. [李庆远, 1983. 中国红壤 [M]. 北京: 科学出版社.]
- LI XW, SANAGI M, LU Y, et al., 2020. Protein phosphorylation dynamics under carbon/nitrogen-nutrient stress and identification of a cell death-related receptor-like kinase in *Arabidopsis* [J]. Front Plant Sci, 11: 377.
- LI XY, HUANG QY, HU HQ, et al., 1995. Forms of active aluminum in acid soils and aluminum phytotoxicity [J]. J Huanzhong Agric Univ, (4): 356-361. [李学垣, 黄巧云,

- 胡红青, 等, 1995. 酸性土壤中活性铝的形态与铝毒 [J]. 华中农业大学学报, (4): 356-361.]
- LU Q, LI SX, CHEN XP, et al., 2017. Current situation, problems and suggestions of peanut breeding in southern China [J]. Chin J Oil Crop Sci, 39(4): 556-566. [鲁清, 李少雄, 陈小平, 等, 2017. 我国南方产区花生育种现状、存在问题及育种建议 [J]. 中国油料作物学报, 39(4): 556-566.]
- MA YY, GAN R, WANG NN, 2005. Biological functions of leucine-rich repeat class of receptor-like protein kinases in plants [J]. J Plant Physiol Mol Biol, 31(4): 331-339. [马媛媛, 甘睿, 王宁宁, 2005. 植物富含亮氨酸重复序列型类受体蛋白激酶的生物学功能 [J]. 植物生理与分子生物学学报, 31(4): 331-339.]
- MU JH, LEE HS, KAO TH, 1994. Characterization of a pollen-expressed receptor-like kinase gene of *Petunia inflata* and the activity of its encoded kinase [J]. Plant Cell, 6(5): 709-721.
- NIBAU C, CHEUNG AY, 2011. New insights into the functional roles of CrRLKs in the control of plant cell growth and development [J]. Plant Signal Behav, 6(5): 655-659.
- OSAKABE Y, MIZUNO S, TANAKA H, et al., 2010. Overproduction of the membrane-bound receptor-like protein kinase 1, RPK1, enhances abiotic stress tolerance in *Arabidopsis* [J]. J Biol Chem, 285(12): 9190-9201.
- SHIU SH, BLEECKER AB, 2001a. Receptor-like kinases from *Arabidopsis* form a monophyletic gene family related to animal receptor kinases [J]. Proc Natl Acad Sci USA, 98(19): 10763-10768.
- SHIU SH, BLEECKER AB, 2001b. Plant receptor-like kinase gene family: diversity, function, and signaling [J]. Sci STKE, (113): re22.
- UEMURA T, HACHISU M, DESAKI Y, et al., 2020. Soy and *Arabidopsis* receptor-like kinases respond to polysaccharide signals from *Spodoptera* species and mediate herbivore resistance [J]. Comm Biol, 3(1): 224.
- VERSLUES PE, LASKY JR, JUENGER TE, et al., 2014. Genome-wide association mapping combined with reverse genetics identifies new effectors of low water potential-induced proline accumulation in *Arabidopsis* [J]. Plant Physiol, 164(1): 144-159.
- WANG X, WU MH, XIAO D, et al., 2021. Genome-wide identification and evolutionary analysis of RLKs involved in the response to aluminium stress in peanut [J]. BMC Plant Biol, 21(1): 281.
- WEI X, WANG YL, ZHANG S, et al., 2022. Structural analysis of receptor-like kinase SOBIR1 reveals mechanisms that regulate its phosphorylation-dependent activation [J]. Plant Comm, 3(2): 100301.
- WRZACZEK M, VAINONEN JP, STAEL S, et al., 2015. GRIM REAPER peptide binds to receptor kinase PRK5 to trigger cell death in *Arabidopsis* [J]. EMBO J, 34(1): 55-66.
- WU DM, CAO HP, SHEN H, 2014. Response of auxin and its transporter to aluminum stress in plants [J]. Plant Physiol J, 50(8): 1135-1143. [吴道铭, 曹华苹, 沈宏, 2014. 生长素及其运输蛋白对植物铝胁迫的响应 [J]. 植物生理学报, 50(8): 1135-1143.]
- XIAO D, LI X, ZHOU YY, et al., 2021. Transcriptome analysis reveals significant difference in gene expression and pathways between two peanut cultivars under Al stress [J]. Gene, 781: 145535.
- XU FF, CHENG SY, TIAN YQ, 2014. Effects of aluminum stress on growth and physiological characteristics in peanut root [J]. J Henan Agric Sci, 43(9): 52-55. [徐芬芬, 程诗雨, 田玉清, 等, 2014. 铝胁迫对花生根系生长和生理特性的影响 [J]. 河南农业科学, 43(9): 52-55.]
- YANG X, RAMONELL D, 2012. Receptor-like kinases and receptor-like proteins: keys to pathogen recognition and defense signaling in plant innate immunity [J]. Front Biol, 7(2): 155-166.
- ZENG RX, LIU XS, LI HY, et al., 2020. Danger peptide signaling enhances internalization of a *Geminivirus* symptom determinant in plant cells during Infection [J]. J Exp Bot, 71(9): 2817-2827.
- ZHAN J, KOU RJ, HE LF, 2008. Effects of aluminum on morphological structure of peanut root tips [J]. Chin J Oil Crop Sci, 30(1): 79-83. [詹洁, 寇瑞杰, 何龙飞, 2008. 铝对花生根尖细胞形态结构的影响 [J]. 中国油料作物学报, 30(1): 79-83.]

(责任编辑 周翠鸣)