

假木通植物补充记载*

黄燮才

(广西药品检验所)

ADDITIONAL DESCRIPTION OF STEPHANOTIS CHUNII TSIANG

Huang Se-zei

(Guangxi Institute for the Control of Drugs)

假木通(*Stephanotis chunii* Tsiang) 隶属于萝藦科 (*Asclepiadaceae*) 黑曼藤属 (*Stephanotis* Thou.), 为我国特有的藤状灌木植物, 现仅见于广西的大瑶山、十万大山和广东的鼎湖山。1936年蒋英教授发表假木通新种时, 没有看见果的标本, 最近从金秀县(大瑶山) 采集到假木通的果实标本, 现补充记载如下, 以供参考。

假木通(中国高等植物图鉴) 大补药、十全大补、瑶佬药、藤列别、铜列(广西金秀瑶语)

Stephanotis chunii Tsiang in Sunyatasenia 3:165, Pl.18, fig. 11, 1936 并于中国植物志 63:468, Pl. 175, 1977.

Fructus adhuc indescripti; Folliculi saepe solitarii conoideo-lanceolati versus apicem attenuati 13 cm longi, 2 cm diam., epicarpio glabro striolato, pedunculo fructifero 2 cm longo, fere glabro; seminibus longe ovatis 10 mm longis, 5—6 mm latis, compressis brunneolis glabris, circumscriptionibus seminum tenui-marginatis, basi rotundatis, apice truncatis comis albosericeis circiter 5.5 cm longis.

Guangxi: Jinxiao Xian, Nov.27, 1981, J. F. Wei 8516.

补果说明: 蓇葖通常单生, 圆锥状披针形, 向顶部渐尖, 长13厘米, 直径2厘米, 外果皮无毛, 有细条纹; 果梗长2厘米, 近无毛; 种子长卵形, 长10毫米, 宽5—6毫米, 扁平, 淡棕色, 无毛, 周围有薄边, 基部圆形, 顶端截形, 具白色绢质种毛, 种毛长约5.5厘米。果期11—12月。

广西: 金秀县, 1981年11月27日, 韦家福 8516。

本种系广西壮族自治区金秀瑶族自治县瑶族的著名药物之一, 沿用已久。主要用叶(根或茎也用), 每用5—15克(鲜品15—30克)配鸡肉或鸡蛋或猪骨煲服, 主治产后或病后虚弱、贫血、肺结核咳嗽、产妇缺乳汁或乳汁少或乳汁不通、月经不调、产后恶露过多、四肢酸软、疲乏无力。

*蒙中国科学院华南植物研究所借给假木通有花标本, 该所周汉泉同志提供原始文献; 又蒙华南农学院林学系李秉滔副教授复核果实标本, 作者敬致谢意。