安徽省唇形科植物地理分布新记录*

薛兆文 王学文 高洁 郭新弧
(安徽省生物研究所) (安徽师范大学)

近年来我们从事于安徽唇形科植物的研究。通过广泛收集资料和标本的采集,在目前已鉴定的标本中,确认为安徽省地理分布新记录的有三个属(*Schnabelia* Hand. -Mazz., *Bostrychanthera* Benth., *Kinostemon* Kudo) 9个种(其中包括前三个属中的三个种)。将为研究安徽植物区系和资源植物提供点资料。现整理初报如下。文后附这些新记录的植物于安徽的分布图(图1)和部分种的照片(图2)

1. 四棱草 *Schnabelia oligophylla* Hand. —Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien. 58: 93. 1921. 图2.(1)

四棱草属有二种一变种,均分布于我国南部和西南部,安徽原未有分布记录。现发现皖南祁门县查湾采育场附近山坡上,海拔400米处和太湖县弥陀附近山坡,海拔350米处均有四棱草分布。此种原记载分布于我国福建、广东、广西、江西、湖南、四川。笔者于1980年于湖北省崇阳县幕阜山亦采得本种标本。四棱草,茎棱角具翅,在节部收缩,叶小,花萼5齿等大。本种主要供药用,可治妇女闭经,有通经活血之效。

标本:祁门县,薛兆文 0390号;太湖县,薛兆文 0923(IBA**);祁门县,郭新弧 82089(UNA***)

2. 毛药花 *Bostrychanthera deflexa* Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 1216. 1876. 图2(2)

毛药花属为单型属,据文献记载,呈散分布于台湾、广东、福建、贵州、四川和湖北。现发现安徽省休宁县杨家山,海拔500米处,祁门县查湾海拔400米处路边,歙县桐子坑海拔450米处均有分布。毛药花属植物有一显著特征,即成熟小坚果为核果状,每花一枚。花药近球形,靠近背部囊状,密被毛茸。我们采的标本形态特征与本种描述完全相同,唯有未成熟核果状小坚果四枚。此标本经李锡文老师鉴定。

标本:祁门县,薛兆文 0382号;休宁县,王学文 0899号(IBA);歙县;郭新弧 80028号(UNA)。

3. 歧伞香茶菜 *Rabdosia macrophylla* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 13(1): 90 1975 *Amethystanthus macrophyllus* Migo in Journ. Shangh. Sci. Inst. Sect. 3, 3: 230, 1937.

*本文承李锡文教授审阅和修改,仅表谢忱。

**IBA=安徽省生物所标本室

***UNA=安徽师范大学植物标本室

图 1 唇形科植物安徽新记录于安徽的分布图

- 图 例: ● *Schnabelia oligophylla* Hand.—Mazz.
 ○ *Bostrychanthera deflexa* Benth.
 △ *Rabdosia macrophylla* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li
 ▲ *Kinostemon ornatum* (Hemsl.) Kudo
 + *Comanthosphace ningpoensis* (Hemsl.) Hand.—Mazz.
 | *Salvia kiangsiensis* C. Y. Wu
 * *Phlomis umbrosa* Turcz.
 ⊕ *Scutellaria pекinensis* var. *purpureicaulis* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li
 • *Teucrium viscidum* Bl.

原有文献记载本种产于江苏镇江一带，生于山坡、路旁或杂林下，海拔 120 米。我们在皖东滁县琅琊山一带，海拔 200 米处，发现有分布，而且比较普遍；大都生长于疏林下，路旁灌丛中。歧伞香茶菜与东北产尾叶香茶菜 *Rabdosia excisa* (Maxim.) Hara 和湖北西部产拟缺香茶菜 *Rabdosia excisoides* (Sun ex C. H. Hu) C. Y. Wu et H. W. Li 颇相似，它们的区别点是：

1. 叶先端顶齿基部渐狭至中肋；花冠上唇四齿，中央两齿较小……………尾叶香茶菜 *R. excisa* (Maxim.) Hara
 1. 叶先端顶齿基部不狭至中肋；花冠上唇四齿相等。
 2. 叶两面被毛；花萼齿裂约为萼长的三分之一；小坚果被毛……………歧伞香茶菜 *R. macrophylla* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li
 2. 叶上面被毛，下面仅脉上被毛，余部无毛；花萼齿裂约至萼的中部或中部以下，小坚果无毛……………拟缺香茶菜 *R. excisoides* (Sun ex C. H. Hu) C. Y. Wu et H. W. Li
- 标本：滁县琅琊山，薛兆文 3948 号，792 号 (IBA)。

图 2 ① *Schnabelia oligophylla* Hand. -Mazz. ② *Bostrychanthera deflexa* Benth.
 ③ *Kinostemon ornatum*(Hemsl.)Kudo ④ *Comanthosphace ningpoensis*(Hemsl.) Hand. -Mazz.
 ⑤ *Phlomis umbrosa* Turcz. ⑥ *Teucrium viscidum* Bl.

4. 动蕊花 *Kinostemon ornatum* (Hemsl.) Kudo in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa. 19: 2. 1929. 图 2 (3)

动蕊花隶于动蕊花属，本属二种二变型，原记载分布于陕西、湖北、四川、贵州、广西、云南。我们发现安徽省岳西县鹤落坪也有动蕊花。一般生长于山坡、干山沟灌丛中，海拔 600—900 米处。茎直立，基部分枝。植物体无毛，花冠紫红色，冠檐二唇形，上唇 2 裂片斜三角状卵形。

标本：岳西县，王学文 619；薛兆文 872 (IBA)。

5. 绵穗苏 *Comanthosphace ningpoensis* (Hemsl.) Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 936. 1936. 图 2 (4)

本种原分布于浙江、江西、湖南、贵州；生于海拔 1200 米。安徽省潜山县天柱山蛇形坦，海拔 1000—1400 米处发现有分布，岳西县、太湖县、歙县等地均有。叶，幼时上面多少具小刚毛，下面疏被星状毛，老时两面近于无毛。花冠内面近冠筒中部有一不规则宽大而密集的毛环。雄蕊 4，前对略长，花药卵球形，1 室，横向开裂。小坚果 3 棱形，长 4 毫米。该种作药用，可治感冒、瘫痪、疮毒、劳伤、吐血等症。

标本：潜山县，郭新弧 8200247 (UNA)；岳西县，王学文 0879 (IBA)。

6. 关公须 *Salvia kiangsiensis* C. Y. Wu in Fl. Reipubl. Pop. Sin. 66: 190, 584. 1977.

叶片披针形，长圆状卵圆形或卵圆形，全为单叶，上面绿色，无毛，下面紫色，沿脉略被微柔毛；茎生叶叶柄长 1 厘米至近无柄，基出叶叶柄长 3—10 厘米；花冠紫色，冠筒内中部有疏柔毛毛环。原记载产江西、湖南、福建。现发现安徽省祁门县溶口山区，海拔 250 米处以及休宁县等地均有分布。生于山坡路旁或林下。本种作药用，有类似丹参之效。

标本：祁门县溶口，王学文 263 (IBA)，休宁县，王学文 875 (IBA)。

7. 糙苏 *Phlomis umbrosa* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou 8: 76. 1840. 图 2 (5)

据记载原分布于辽宁、内蒙古、陕西、山西、甘肃、河北、湖北、四川、贵州。现发现安徽省岳西县鹞落坪，海拔 800—1100 米处，疏林下，亦有此种分布。糙苏的苞片与花萼等长或略超过，苞片较坚硬，线状钻形。此种是一重要的资源植物，主要作药用，有消肿、生肌、接骨、补肝肾、壮腰膝、安胎等作用。

标本：岳西县，王学文 608 (IBA)

8. 紫茎京黄芩 *Scutellaria pekinensis* Maxim. var. *purpureicaulis* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li in Fl. Reipubl. Pop. Sin. 65 (2): 183. 1977 — *S. japonica* Franch. et Sav. var. *purpureicaulis* Migo in Journ. Shangh. Sci. Inst. Sect. 3, 3: 90. 1935.

原文献记载紫茎京黄芩分布于山东、浙江、江苏、江西、福建。现发现于安徽省金寨县白马寨小海棠，海拔 1000 米处有分布，生于山坡灌丛中。

标本：金寨县，薛兆文 732 (IBA)

9. 血见愁 *Teucrium viscidum* Bl. Bijdr. 827. 1825. 图 2, (6)

多年生直立草本。叶片卵状矩圆形。苞片全缘。花长不到 1 厘米，萼长 2.8 毫米，钟形，外面密被腺长柔毛；花冠长 6.5—7.5 毫米。花期 7—8 月。据文献记载，原分布于我国江苏南部、浙江、福建、台湾、江西、湖南、广东、广西、云南、四川、西藏。日本、印度、印度尼西亚、缅甸、菲律宾、朝鲜也有。我们于安徽省潜山县天柱山蛇形坦，海拔 1100 米处采得此种。全草入药可治风湿性关节炎、急性肠胃炎等症。

标本：潜山县，郭新弧 820258 (UNA)

主 要 参 考 文 献

- [1] 吴征镒、李锡文主编, 1977: 中国植物志, 65卷, 第二分册, 66卷, 科学出版社。
- [2] 中国科学院北京植物研究所主编, 1974: 中国高等植物图鉴, 第三册, 科学出版社。
- [3] 侯宽昭编, 1982: 中国种子植物科属词典(修订版), 科学出版社。
- [4] 吴征镒、李锡文, 1982: 论唇形科的进化与分布, 云南植物研究 4 (2): 97—118。
- [5] 薛兆文, 1982, 3: 湖北东部唇形科植物的初步研究, 华中师院学报(自然科学版)增刊81—92。
- [6] Albert N. Steward, 1958: *Manual of Vascular Plants of the Lower Yangtze Valley, China.*

THE NEW RECORDED TAXA OF LABIATAE
FROM ANHUI PROVINCE

Xue Zhao-wen Wang Xue wen Gao Ji
(Anhui Institute of Biolage)
Guo Xin-hu
(Anhui Teacher's Universty)

In this paper, the authors have reported nine taxa of Labiatae which are formerly unrecorded in Anhui Province. These taxa are *Schnabelia oligophylla* Hand.—Mazz., *Bostrychanthera deflexa* Benth., *Kinostemon ornatum* (Hemsl.) Kudo, *Rabdosia macrophylla* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li, *Comanthosphace ningpoensis* (Hemsl.) Hand.—Mazz., *Salvia kiangsiensis* C. Y. Wu, *Phlomis umbrosa* Turcz., *Scutellaria pekinensis* Maxim. var. *purpureicaulis* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li and *Teucrium viscidum* Bl. The first three taxa of them are also now genera recorded in Anhui Province. In addition the authors have given a brief account for each taxon.