

广西马兜铃属资料

黄 燮 才

(广西药品检验所)

MATERIAL FOR GUANGXI ARISTOLOCHIA LINN

Huang Se-zei

(Guangxi Institute for Drug Control)

Key words: *Aristolochia impressinervia*

关键词: 凹脉马兜铃

凹脉马兜铃 穿石藤 (桂西南) 图

Aristolochia impressinervia C. F. Liang in *Acta Phytotax. Sin.* 13 (2): 15. 1975.

Ad descriptionem addenda: Racemi circa 3 cm longi, axillares, 3—5-flori; pedunculi pedicellique circa 3 mm longi, omnino puberuli; bractee ovatae sessiles, 6—7 mm longae, 1.5—2.5 mm latae, utrinque puberulae; perianthia 2.3 cm longa, intus glabra, extus puberula, basi in utriculum globosum tumente, circa 4 mm diam., infra utriculum angustitubulatum, 1.5 mm longum, 0.5 mm diam., supra utriculum tubulatum, 5 mm longum, 1.5 mm diam., eemum in limbum late ellipticum, 1.1 cm longum, 0.9 cm latum, apice obtusum mucronatum; ovarium obovatum puberulum, 4 mm longum, 2 mm latum, hexagonum; stamina 6, antheris circa 1 mm longis, aequidistantibus, singulatim singulis columnae lobis oppositis, columna stylina erassa disciformis, apice 6-lobata, lobis triangulis, circa 1 mm longis.

Guangxi: Fusui Xian, Jinji Cun, Aug. 1963, S. Z. Huang 5521 (Fl., GXMI).

Stem or plant applied to stop bleeding, pain (Field No. 5521, 4210). Plant used for rheumatism (Field No. 2—0227). Stem used for infantile malnutrition (Field No. 5521), also an ingredient in a prescription for infantile paralysis (Selected Works of Guangxi Proved Recipe, 2:186. 1963).

补充记载: 总状花序长约3厘米, 腋生, 具3—5朵花, 总梗和花梗长约3毫米, 均被短柔毛; 苞片卵形, 无柄, 长5—7毫米, 宽1.5—2.5毫米, 两面均被短柔毛; 花被长2.3厘米

米，里面无毛，外面被短柔毛，基部膨大呈囊状球形，直径约4毫米，其下呈狭管状，管长1.5毫米，直径0.5毫米，其上呈管状，管长5毫米，直径1.5毫米，最后延伸呈舌状，舌片宽椭圆形，长1.1厘米，宽0.9厘米，顶端钝而有小突尖；子房倒卵形，被短柔毛，长4毫米，宽2毫米，具6棱；雄蕊6，花药长约1毫米，等距离排列，每个与合蕊柱的裂片对生，合蕊柱粗厚，盘状，顶端6裂，裂片三角形，长约1毫米。

广西：扶绥县，金鸡村，1963年8月，黄燮才5521（花标本，存广西壮族自治区中医药研究所）。

本种系广西壮族自治区的壮族药。茎或全株用于止血，止痛（黄燮才5521、韦葵芳4210）。全株用于治风湿症（黄冬生2—0227）。茎用于治小儿疳积（黄燮才5521），也是治疗小儿麻痹症药方的成分之一（《广西中医验方选集》第二集，186页，广西人民出版社，1963年版）。

承广西壮族自治区中医药研究所借用标本，韦家福同志绘图，作者敬致谢意。




图 凹脉马兜铃 *Aristolochia impressinervia*
C. F. Liang
1. 花序； 2. 合蕊柱。