

我国地方植物志出版情况简介

马金双

(北京师范大学, 北京)

INTRODUCTION TO LOCAL FLORAS OF CHINA

Ma Jinshuang

(Beijing Normal University, Beijing)

近年来, 我国植物志的编写、出版工作较为喜人。除了世界瞩目的《中国植物志》(共80卷125分册, 目前已出版50多卷册)外, 地方植物志的编写、出版也取得了较大进展。为使读者能有一个较系统地了解, 笔者根据北京图书馆、中国科学院图书馆、中国科学院植物研究所图书馆及北京师范大学生物系资料室所收藏的资料作了如下统计, 出版时间截止1988年底。因依据的资料有限, 一定还有遗漏, 欢迎海内外学者指正。另外本文范围仅限高等植物。

我国地方植物志大体可分为两种: 其一是跨省(区)的植物志, 它们是:

《东北木本植物图志》(全一册, 1955年)。《东北草本植物志》, 1卷, 蕨类, 1958; 2卷, 金粟兰科—马兜铃科, 1959; 3卷, 石竹科—防己科, 1975; 4卷, 罂粟科—虎耳草科, 1980; 5卷, 蔷薇科—豆科, 1976; 6卷, 酢浆草科—伞形科; 7卷, 鹿蹄草科—唇形科, 1981; 11卷, 莎草科, 1976; 其余卷未出版, 下同。《东北藓类植物志》, 全一册, 1977。《东北苔类植物志》, 全一册, 1981。《秦岭植物志》1卷, 种子植物(1册, 裸子植物和被子植物的单子叶植物, 1976; 2册, 三白草科—蔷薇科, 1974; 3册, 豆科—山茱萸科, 1981; 4册, 鹿蹄草科—车前科, 1983; 5册, 茜草科—菊科, 1985); 2卷, 蕨类植物, 1974; 3卷(1册, 藓类植物, 1978)。《中国沙漠植物志》, 1卷, 裸子植物、单子叶植物和被子植物的杨柳科—防己科, 1985; 2卷, 罂粟科—伞形科, 1987。《陕甘宁盆地植物志》, 全一册, 1957(裸子植物和被子植物)。

其二是各省(区、市)的植物志, 又可分为已出版完和部分出版二种情况: 已完成初版和第二版的是:

《北京植物志》, 第一版, 上册, 蕨类植物、裸子植物和被子植物的金粟兰科—豆科, 1962; 中册, 酢浆草科—菊科, 1964; 下册, 单子叶植物, 1975; 第二版, 上册, 蕨类植物、裸子植物和被子植物的金粟兰科—山茱萸科, 1984; 下册, 鹿蹄草科—兰科, 1987。《内蒙古植物志》, 1卷, 区系概况、蕨类植物、裸子植物、被子植物的金粟兰科—马兜铃科, 1985; 2卷, 蓼科—十字花科, 1978; 3卷, 景天科—豆科, 1977; 4卷, 酢浆草科—山茱萸科, 1979; 5卷, 鹿蹄草科—桔梗科, 1980; 6卷, 菊科, 1982; 7卷, 香蒲科—禾本科, 1983; 8卷, 莎草科—兰科及补编。该志第二版已分为3卷, 即将出版。《海南植物志》, 1卷, 蕨类植物、裸子植物和被子植物的木兰科—龙脑香科, 1964; 2卷, 桃金娘科—蛇菰科, 1965; 3卷, 鼠李科—爵床科, 1974; 4卷, 马鞭草科—禾本科, 1977。该志共4卷, 基本依据哈钦松系统。《江西植物志》, 全一册, 1960。《江苏植物志》, 上册, 蕨类植物、裸子植物和被子植物的单子叶植物, 1977; 下册, 三白草科—菊科, 1982。《西藏植物志》, 1卷, 蕨类植物、裸子植物和被子植物的三白草科—石竹科, 1983; 2卷, 睡莲科—豆科, 1985; 3卷, 酢浆草科—龙胆科, 1986; 4卷, 夹竹桃科—菊科, 1985; 5卷, 单子叶植物及西藏植物区系的起源与演化, 1987。《西藏苔藓植物志》, 全一册, 1985。《台湾木本植物图志》,

上册, 1960; 下册, 1962。《台湾植物志》(Flora of Taiwan), 英文版, 1 卷, 蕨类和裸子植物, 1975; 2 卷, 杨梅科—十字花科, 1976; 3 卷, 金缕梅科—伞形科, 1977; 4 卷, 岩梅科—菊科, 1978; 5 卷, 单子叶植物, 1978; 6 卷, 台湾维管植物名录、文献及中拉名索引等, 1979。《广州植物志》, 全一册, 1956。已部分出版有: 《福建植物志》, 1 卷, 蕨类植物、裸子植物和被子植物的单被花类, 1982; 2 卷, 睡莲科—金虎尾科, 1985; 3 卷, 远志科—红木科及豆科(2 卷遗漏), 1987, 余未出版, 下同。《安徽植物志》, 1 卷, 蕨类和裸子植物, 1986; 2 卷, 杨梅科—海桐花科, 1987。《贵州植物志》, 1 卷, 裸子植物和被子植物中的三白草科、金粟兰科、杨柳科、杨梅科、胡桃科、桦木科、榛科、壳斗科、榆科、马尾树科、桑科、大麻科、山龙眼科、铁青树科、马兜铃科、蓼科、藜科、苋科、紫茉莉科、商陆科、马齿苋科、落葵科、石竹科、睡莲科、金鱼藻科、领春木科、番荔枝科、茅膏菜科、金缕梅科、杜仲科、悬铃木科、旱金莲科、马桑科、漆树科、无患子科、木棉科、怪柳科、山榄科、胡麻科和狸藻科, 1982。《青海木本植物志》, 全一册, 含裸子植物和被子植物, 1987。《广东植物志》, 基本采用哈钦松系统, 但较重要的科先出版。1 卷, 含有木兰科、五味子科、防己科、马兜铃科、胡椒科、三白草科、白花菜科、海桑科、山龙眼科、海桐花科、红树科、杜英科、梧桐科、金缕梅科、桑科、桑寄生科、苦木科、无患子科、清风藤科、五加科、杜鹃花科、越橘科、紫金牛科、安息香科、山矾科、夹竹桃科、萝藦科、杠柳科和报春花科, 1987 年出版。《河北植物志》, 1 卷, 苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物的金粟兰科—豆科, 1986。《河南植物志》, 1 卷, 蕨类植物、裸子植物和被子植物的三白草科—樟科, 1981; 2 卷, 罂粟科—葡萄科, 1988。《湖北植物志》, 1 卷, 裸子植物和被子植物的三白草科—樟科, 1976; 2 卷, 罂粟科—清风藤科, 1979。《黑龙江植物志》, 1 卷, 苔纲和角苔纲, 1985。《辽宁植物志》, 上册, 蕨类植物、裸子植物和被子植物的离瓣花类(胡桃科—伞形科), 1988。《宁夏植物志》, 1 卷, 蕨类植物、裸子植物和被子植物的金粟兰科—藤黄科, 1986。《云南植物志》, 该志按哈钦松系统编写, 但先完成的科组成一卷, 先出版, 因而排列顺序有所变动。第一卷(1977)含 28 科(肉豆蔻科、大血藤科、金粟兰科、商陆科、山龙眼科、西番莲科、猕猴桃科、使君子科、红树科、鼠刺科、金缕梅科、黄杨科、大麻科、茶茱萸科、心翼果科、苦木科、橄榄科、楝科、无患子科、紫树科、珙桐科、山榄科、紫金牛科、蓝雪科、马鞭草科、透骨草科、六苞藤科、唇形科); 第二卷(1979)含 22 科(木通科、大花草科、罂粟科、山柑科、野牡丹科、梧桐科、锦葵科、壳斗科、九子母科、省沽油科、漆树科、五加科、桉叶树科、半边莲科、花荵科、田基麻科、茄科、旋花科、菟丝子科、紫葳科、芭蕉科、天南星科); 第三卷(1983)含 20 科(樟科、莲叶桐科、防己科、远志科、黄叶树科、千屈菜科、海桐科、四数木科、木棉科、旌节花科、桑寄生科、蛇菰科、柿树科、野茉莉科、马钱科、夹竹桃科、萝藦科、五福花科、鸭跖草科、薯蓣科); 第四卷(1986)含裸子植物和被子植物 22 科(即金鱼藻科、睡莲科、茅膏菜科、柳叶菜科、菱科、小二仙草科、杉叶藻科、天料木科、金刀木科、冬青科、翅子藤科、檀香科、清风藤科、杜鹃花科、木樨科、睡菜科、紫草科、狸藻科、花蔺科、水鳖科、泽泻科、眼子菜科)。《四川植物志》, 按恩格勒系统编写, 但先完成的科组成一卷先出版, 因而排列顺序有所变动。第一卷(1981)含 20 科(蜡梅科、樟科、连香树科、三白草科、金粟兰科、悬铃木科、槭科、七叶树科、省沽油科、木棉科、梧桐科、胡颓子科、使君子科、八角枫科、兰果树科、珙桐科、山茱萸科、桉叶树科、安息香科、山矾科); 第二卷(1983)含裸子植物; 第三卷(1985)含 11 科(杨梅科、胡桃科、杨柳科、榆科、商陆科、落葵科、旱金莲科、鼠李科、旌节花科、岩梅科、柿科)。第四卷(1988)含 14 科(藜科、领春木科、猕猴桃科、海桐花科、马桑科、漆树科、清风藤科、冬青科、卫矛科、杜英科、石榴科、花荵科、旋花科、紫葳科); 第六卷(1988), 蕨类植物的石杉科—睫毛蕨科。

其它省(区)正在积极编写中, 不久可望有更多的省(区)植物志与读者见面。

最后应该说明, 我国地方植物志收录的范围不同, 一些起点是苔藓类, 一些是蕨类, 还有的是种子植物; 在出版顺序上, 多数是按某一系统先后顺序出版, 但也有的植物志打破系统顺序, 而是先完成的科组成一卷先出版, 因此出现某一卷内含有相邻的科, 而相邻的科又不在同一卷内。收录的起点和出版的顺序均无关大局, 只要使用前了解便会带来方便。