

Lecomate, Fl. Gen. Indo-Chine 7 (2): 473. 1941. ——*Phymatosorus variabilis* (Ching) Pic. Ser. in Webbia 28 (2): 460. 1973. ——*Polypodium alternifolium* Wild., Sp. Pl. 5: 168. 1810. ——*Microsorum alternifolium* (Willd.) Copel., Gen. Fil. 197. 1947.

分布于云南、海南；越南、柬埔寨、泰国、印度、斯里兰卡、菲律宾、马来亚、马来西亚、印度尼西亚、新几内亚、澳大利亚及玻利尼西亚等。模式标本采自澳大利亚。

矛叶瘤蕨

Phymatosorus lanceus (Ching et C. H. Wang) S. G. Lu, comb. nov.

——*Phymatodes lanceus* Ching et C. H. Wang in Acta Phytotax. Sin. 8 (2): 153, Pl. 23, f. 29. 1959.

海南特产。模式标本采自海南保亭。

罗汉松叶乌饭补充记载

林亲众

(中南林学院, 湖南株洲 412006)

关键词 罗汉松叶乌饭; 补充记载

Additional description of *Vaccinium podocarpoideum*

Lin Qinzhong

(College of Forestry, Southcentral China, Zhuzhou Hunan 412006)

Key words *Vaccinium podocarpoideum*; additional description

罗汉松叶乌饭

Vaccinium podocarpoideum Fang et Z. H. Pan in Act. Phytotax. Sin. 19: 107. 1981.

Racemi ex axillis superioribus orti, 2.5~3.5 cm longi, (5) 7~11-flori, rachidibus et pedicellis glabris, bracteae deciduae; pedicelli 5 mm longi. Calycis tubus glaber, lobis 5, deltoideis, 1.5~1.8 mm longis glabris; corolla alba campanulata, utrinque glabra, limbo 5-lobo, lobis ovato-deltoides, 1~1.2 mm longis; Stamina 10, 5.5~6 mm longa, filamentis 1 mm longis puberulis, antheris dorso minute bicalcaratis, apice 2-tubiformibus, tubuli thecis duplo longi (tubuli 3 mm longi, theci 1.5 mm longi), ovarium et stylus glaber, stylis 5.5 mm longis.

Hunan (湖南): Shuining county (绥宁县), Huang shuang (黄双), alt. 1 600 m, Aug. 1980, Q. Z. Lin (林亲众) 15667 (Type, Fl. CSFI)

花模式标本承方瑞征先生鉴定，谨此致谢。