

# 云南宿苞豆属一新种

钱义咏

(云南省思茅行署林业局, 云南思茅 665000)

**摘要:** 报道了云南发现宿苞豆属一新种。

**关键词:** 宿苞豆属; 澜沧宿苞豆; 云南

中图分类号: Q949 文献标识码: A 文章编号: 1000-3142(2003)04-0307-02

## A new species of *Shuteria* from Yunnan, China

QIAN Yi-yong

(Forestry Bureau, Simao Administrative Office, Simao 665000, China)

**Abstract:** A new species of *Shuteria* Wight et Arn. were reported.

**Key words:** *Shuteria*; *Shuteria lancangensis*; Yunnan

### 澜沧宿苞豆 新种 图1

*Shuteria lancangensis* Y. Y. Qian, sp. nov.

Fig. 1.

Species affinis *S. hirsutae*, sed caule patenter-villoso, petiolis longioribus, foliolis late ovato-rhombeis, papyraceis, angustioribus, basi late cuneatis vel obtusis, calycis lobis 4, corollis longioribus, vexillis basi auriculatis differt.

Herba volubilis, 2~4 m longa. Caulis gracilis, striatus, patenter villosus. Folia pinnata 3-foliola; stipulae lanceolatae, 8~10 mm longae, persistentes; petoli 4~7 cm longi; foliola late ovato-rhombea, papyracea, 4.5~8.5 cm longa, 3~7 cm lata, apice acuminata, basi late cuneata vel obtusa, supra-atro-viridia, subtus viridia, utrinque patenter villosa, nervis lateribus 3~5-jugatis conspicuis; stipellae subulatae, ciliatae; petioluli 3~5 mm longi, villosi. Racemi axillares, 10~14 cm longi, 30~50-floriferi; nodi floriferi 1~4-floribus; pedunculi 1~4 cm longi, villosi; bracteae linear-lanceolati vel lineares, 6~8 mm longi, persistentes; pedicelli c. 3




图1 澜沧宿苞豆 *Shuteria lancangensis* Y. Y. Qian  
1.花枝 Flowering branch; 2.花萼展开 Opened calyx; 3.花瓣 Petal.

收稿日期: 2002-04-26 修订日期: 2002-10-28

作者简介: 钱义咏(1930-),男,浙江嵊州市人,林业工程师,从事植物分类学研究。

mm longi; bracteolae lineares, c. 2 mm longae, ciliatae, persistentes; calyx tubulosus, lobis 4, ovatis, 1.5~2 mm longis, superioribus magnioribus. tubo brevioribus; corollae 14~16 mm longae, purpureae; vexillum obovatum, basi 2-auriculatum, ungue cuneato; alae oblongae, auriculatae, unguicillatae; carinae alas aequantes, auriculatae. Stamina diadelpha, vexillare basi et superne solutum. Ovarium villosum. legumen oblongum, compressum, subcurvum. 6~6.5 cm longum, 3~3.5 mm latum, villosum, apice rostratum. 11-seminibus.

**Yunnan**(云南): Lancang(澜沧), alt. 1 900 m, in thickets, 28 Sept., 1992, Qian Yi-yong(钱义咏) 2683(Holotype HITBC; Isotype IBK)

草质缠绕藤本, 长2~4 m。茎纤细, 具纵棱, 被开展长柔毛。羽状复叶具有3小叶; 托叶披针形, 长8~10 mm, 宿存; 叶柄长4~7 cm; 小叶宽卵状菱形, 纸质, 长4.5~8.5 cm, 宽3~7 cm, 光端渐尖, 基

部宽楔形或钝, 上面深绿色, 下面绿色, 两面被开展长柔毛, 侧脉3~5对, 明显; 小托叶钻状, 具缘毛; 小叶柄长3~5 mm, 被长柔毛。总状花序腋生, 长10~14 cm, 具30~50朵花, 每节具1~4朵花; 总花梗长1~4 cm, 被长柔毛; 苞片线状披针形或线形, 长6~8 mm, 具缘毛, 宿存; 花梗长约3 mm; 小苞片线形, 长约2 mm, 被缘毛, 宿存, 花萼管状, 裂片4, 卵形, 长1.5~2 mm, 上部一枚较大均比萼管短; 花冠长14~16 mm, 紫色; 旗瓣倒卵形; 龙骨瓣与翼瓣近等长, 有耳。雄蕊二体, 对旗瓣1枚雄蕊, 基部和上部与雄蕊管分离。子房被长柔毛。蒴果长圆形、扁, 稍弯, 长6~6.5 cm, 宽3~3.5 mm, 被长柔毛, 先端喙状, 具种子约11颗。花期8~10月, 果期10~12月。

本种与硬毛宿苞豆 *S. hiruta* Baker 相近, 但茎被开展长柔毛, 叶柄较长, 小叶宽卵状菱形, 纸质, 较狭, 基部宽楔形或钝, 花萼裂片4, 花冠较长, 旗瓣基部具耳, 易于区别。

(上接第310页 Continue from page 310)

- of China (Volume 2)[M]. Beijing: Science Press, 227~233.  
 Howard A Crum, Lewis E Anderson. 1981a. Pottiaceae, Mosses of Eastern North America (Volume 1)[M]. 382~401.  
 Howard A Crum, Lewis E Anderson. 1981b. Encalyptaceae, Mosses of Eastern North America (Volume 1)[M]. 261~265.  
 Noguchi A. 1988a. Illustrated Moss Flora of Japan [M]. Part 2. Supplemented by Zennoske Iwatsuki. Hattori Botanical Laboratory, obi, Nichinan-shi, Japan. 256~257.

- 320~325.  
 Noguchi A. 1988b. Illustrated Moss Flora of Japan [M]. Part 2. Supplemented by Zennoske Iwatsuki. Encalyptaceae, Hattori Botanical Laboratory, obi, Nichinan-shi, Japan. 256~257.  
 Zhao JC(赵建成), Li XQ(李秀芹), Tang WB(唐伟斌). 2002. A study on the taxonomy and distribution of Encalyptaceae(Musci) in China(中国大帽藓科(Encalyptaceae, Musci)植物分类和分布的研究)[J]. Acta Botanica Boreali-occidentalia(西北植物学报), 22(3): 453~466.